

**ABCD2 score(Age, Blood pressure, Clinical symptoms, Duration, Diabetes)**

Enkelt scoringssystem for å identifisere personer som har høy tidlig risiko for hjerneslag etter TIA

Alder > 60 år	1 poeng
Blodtrykk Systolisk BT >140 mm Hg eller diastolisk BT >90 mm Hg	1 poeng
Halvsidig lammelse	2 poeng
Språk/taleforstyrrelse uten lammelse	1 poeng
Varighet                   10-59 min	1 poeng
> 60 min	2 poeng
Diabetes	1 poeng
<b>Max score</b>	<b>7 poeng</b>

Risiko for slag

0-3 poeng: lav risiko

4-5 poeng, moderat risiko

6-7 poeng, høy risiko

Liten risiko: Pasienter med ABCD2-score 0-3 har liten risiko for hjerneslag i de første dager/første uke (0- 2 %). Slike pasienter kan utredes poliklinisk.

Moderat risiko: Pasienter med score 4-5 har moderat risiko for hjerneslag i de første dager/første uke (3- 5 %). Slike pasienter bør som hovedregel innlegges, alternativt tilbys akutt poliklinisk utredning

Høy risiko: Pasienter med score 6-7 har høy risiko (>5 %) for hjerneslag kort tid etter TIA, og innleggelse som øyeblikkelig hjelp tilrås.