Oppfølgning ved Natalizumab (Tysabri®) behandling ved MS

Navn	Tidligere behandling	**MR**	**JC virus**
	1.	Før beh:	6 mnd:
		12 mnd:	12 mnd:
	2.	24 mnd:	18 mnd:
		36 mnd:	24 mnd:
	3.		30 mnd:
		NAB	36 mnd:
		6 mnd:	42 mnd:
		12 mnd:	48 mnd:

Oppstart dato:	• Skjema føres hver mnd av sykepleier • Nevrolog skal vurdere pasienten ved oppstart, etter 3 og 6 mnd, deretter hver 6.mnd • Ved tegn til nytt attakk, sykdomsprogresjon eller bivirkninger skal pasienten vurderes av nevrolog • Blodprøver (hvite med diff, Hb, trc, CRP, kreatinin, ASAT, ALAT, ALP, gamma GT, bilirubin, Na, K) tas ved 1., 2., 3., og 6. kur, deretter hver 6. kur, eller ved klinisk mistanke om infeksjon, leveraffeksjon el

Infusjon				Bivirkninger			Ny	BT/puls	BT/puls	Sign spl	Sign lege
Nr	Dato	Attakk	EDSS	Infeksjon	Allergi	Andre	medisin	Før inf	Etter inf		